

黃氏

雅舒安抗甲癬油劑

Amocoat Nail Lacquer "H. S."

[成分]：Each ml contains
Amorolfine Hydrochloride-----55.74mg
(5%(w/v) Amorolfine)

[藥理作用]：依文獻記載

本品為一種局部抗黴菌劑。活性成分 Amorolfine HCl 屬新類別的抗黴菌化學成分，其主要是以影響固醇的生物合成作用，改變黴菌的細胞膜而達到抑制黴菌及殺黴菌的作用。當麥角固醇內容物被減少的同時，立體非平面固醇類則逐漸積聚。體外試驗結果，Amorolfine 的抗黴效用範圍甚廣，適用於：

- 皮真菌(Dermatophytes)：髮癬菌屬(Trichophyton)、小孢子菌屬(Microsporium)、表皮菌屬(Epidermophyton)。
- 酵母菌(Yeasts)：念珠菌屬(Candida)。
- 黴菌(Moulds)：交鏈孢黴屬(Alternaria)、小帚樣黴屬(Scopulariopsis)、韓德森黴屬(Hendersonula)。

除了放線菌屬(Actinomycetes)之外，一般細菌對 Amorolfine 並不敏感。

[藥物動力學]：依文獻記載

此油劑中所含的 Amorolfine 可穿透趾(指)甲片，因此能夠根絕在趾(指)甲床內很難以接觸到的黴菌。此種給藥方式，活性成分的全身吸收非常低，即使持續使用一年，血中濃度仍低於分析測試的敏感限度。

[適應症]：

皮真菌、酵母菌及黴菌引起之甲癬。

[用法用量]：本藥須由醫師處方使用

將此油劑塗於患者之手、腳趾，每週 1~2 次。

說明：患者應按下述方式塗抹此油劑：

- 1.治療前，先使用指甲剪或刀，儘量將感染部位的指甲剪除或指甲面磨平（戴手套避免接觸感染之指甲，以免遭到傳染；治療前指甲的處理愈徹底治癒率愈高），以酒精棉紙擦拭，清潔受染的趾(指)甲表面。小心慎勿銼到趾(指)甲周圍皮膚。

注意，用在感染趾(指)甲的銼刀禁忌用在健康趾(指)甲。

- 2.將藥液使用毛刷（隨瓶附贈）均勻塗抹在受感染的指甲面，每星期 1~2 次，最好在睡覺前使用，如有可能儘量將藥液塗抹到指甲或皮膚下，以增強藥效。讓指甲油乾燥形成薄膜（約 3~5 分鐘），對每片受感染的趾(指)甲患部重複施藥一次。用藥後 8 個小時內請勿洗澡或淋浴。
- 3..此藥瓶在使用後需立刻關緊以免油劑揮發乾掉。



step 1



step 2



step 3



step 4

- 4.用後以酒精棉紙擦拭瓶頸以保乾淨。
- 5.每次施藥前先用酒精儘量將膜洗除，再用指甲刀或銼刀將受感染的指甲修剪磨平（注意事項同前），然後用毛刷將藥液均勻塗抹在患部。
6. 重覆 1 到 5 的步驟，直到趾(指)甲再生，患部痊癒為止，請勿間斷。治療時間視患部情況而定，通常手指甲需六個月，腳趾甲需九至十二個月。

工作上若有用到有機溶劑(稀釋液、酒精等)時，應穿戴防透手套 以保護趾(指)甲上本品油劑的完整。

[禁忌症]：依文獻記載

對使用本品趾(指)甲油劑呈現過敏反應之病患，不可再使用本趾(指)甲油劑。

[副作用]：依文獻記載

有極少數的病人在塗敷此油劑後，趾(指)甲偶而會發生輕度、短暫灼熱感。

[警語和注意事項]：依文獻記載

一般注意：用於患癬部位的指甲銼刀，不可再用於健康的趾(指)甲。治療期間應避免使用化妝品類的指甲油劑及人工指甲。

用於兒童：目前本品尚無治療兒童之臨床經驗，因此不宜用於兒童。

[懷孕和哺乳] 依文獻記載

將懷孕母免暴露於體內高劑量 Amorolfine 造成輕微上升的胚胎再吸收(胚胎毒性)。由於使用本品趾(指)甲油劑之後，Amorolfine 的體內含量極低，因此對於人類胎兒的危險應可忽略。然而由於缺乏治療懷孕和哺乳母親之臨床經驗，因此本油劑應避免用於懷孕和哺乳期間。

[過量] 依文獻記載

預期用藥過量不會導致任何臨床問題。

[使用期限] 包裝上印刷的有效期限過後不應繼續使用。

[儲存] 於不超過 25°C 溫度處，避開熱源儲存。

置於兒童不能觸及之處。

[包裝] 4000ml 以下玻璃容器裝

cGMP 藥廠

黃氏製藥股份有限公司

雲林縣斗南鎮大同路 444 巷 11 號

