

三軍總醫院「文宣品及公佈欄」 審核單位：教學室	
核准張貼期限	自112年6月10日起
	至112年8月31日止
核准張貼專用章	



俗稱「天狗熱」或「斷骨熱」，是一種藉由病媒蚊叮咬而感染的急性傳染病

# 『登革熱』的痛痛痛！！

- 臺灣自1987年以後，每年均有發生規模不同的本土疫情。
- 2014及2015年則發生歷年最嚴峻的登革熱疫情，病例數超過萬例以上，疫情集中於高雄市及臺南市。

- 由黃病毒科 (Flaviviridae) 黃病毒屬 (Flavivirus) 中的登革病毒亞屬所引起。
- 單股 RNA 病毒，可分為 I、II、III、IV 型四種血清型別。
- 可分為「典型登革熱」及「登革出血熱」。
- 再次感染不同型別登革病毒，可能發生症狀較嚴重的登革熱重症


病媒：台灣主要為埃及斑蚊，其次是白線斑蚊  
宿主：人、猴子(馬來西亞與非洲發現)

- 出現發燒、頭痛、疲勞、噁心、嘔吐、肌肉痛、關節痛及出疹。一般症狀會持續幾天到兩週。
- 典型登革熱致死率低於1%
- 登革熱重症若無適當治療，死亡率可超過20%，早期診斷並適當治療，死亡率可低於1%
- 登革熱沒有特效藥物治療皆採支持性療法

## 臺灣近5年登革熱流行情形

發病年份	確定病例	本土登革重症	主要流行地區 (本土病例數)	備註
2018	533	1	臺中市(113)、新北市(44)、高雄市(12)、彰化縣(8)、臺北市(2)、嘉義縣(2)、桃園市(1)、臺南市(1)	本土(183)、 境外(350)
2019	640	0	高雄市(58)、臺南市(31)、新北市(7)、臺北市(2)、桃園市(1)、臺中市(1)	本土(100)、 境外(540)
2020	137	0	新北市(50)、桃園市(23)	本土(64)、 境外(73)
2021	12	0	-	本土(0)、 境外(12)
2022	88	0	高雄市(18)、臺中市(2)	本土(20)、 境外(68)

## 登革熱傳染時程圖



## ※預防方式

資料來源：疾病管制署

預防登革熱要從處理蚊子的幼蟲(孑孓)開始，而不只是消滅成蚊。  
「沒有孳生源，就沒有病媒蚊；沒有病媒蚊，就沒有登革熱」！



## 孳生源處理原則

- **儲水或盛水容器：**  
不用時倒置，使用時加蓋密封。
- **廢棄容器：**  
勿隨意堆積或丟棄於戶外，若為無法自行處理的大型廢棄物，應交由清潔隊運走。
- **清除所有可能會積水的容器：**  
無論是天然的樹洞竹洞，或是人為建築的屋頂排水溝、雨棚、水表座積水，甚至是庭院造景可能的積水處，都應加以處理，以避免孳生病媒蚊。
- **養殖水生植物的容器：**  
放入水草、小石頭或養食蚊魚。

什麼是孳生源呢？  
就是積水容器。

# 蚊子親親 須留心

## 登革熱 | 常見症狀



- 高燒
- 頭痛
- 後眼窩痛
- 肌肉痛
- 關節痛
- 出疹



# 掌握蚊子的習性

## 預防登革熱及屈公病

埃及斑蚊



白線斑蚊



V.S.

喜好室內

棲息

喜好室外

北迴歸線以南  
地區

分佈地區

全台1500公尺以下  
山區及平地

易受驚動  
而中斷吸血

吸血習性

吸飽血液後  
才離開

雌性斑蚊朝九晚五  
早上9-10點、下午4-5點為吸血高峰期！

# 不讓「蚊」親!



清除潛在孳生源

「巡」

檢查居家室內外  
可能積水的容器



「倒」

倒掉積水，並將  
無用的器物予以回收



「清」

減少容器  
使用過需澈底清潔



「刷」

刷除蟲卵  
避免積水養蚊



# 天氣炎熱蚊蟲多

## 遠離登革熱



衛生福利部疾病管制署 廣  
TAIWAN CDC 告

### NO! 不讓蚊生



巡視花器、水溝



澈底清潔  
戶內外容器



刷除蟲卵  
容器要收好



倒除  
積水容器



容器倒蓋



### NO! 不讓蚊叮



儘量避免在  
戶外樹蔭逗留



穿著淺色  
的長袖衣褲



使用核准  
含有DEET  
防蚊液

### NO! 不讓蚊進



蚊香驅蚊  
或噴灑殺蟲劑

家中設置  
紗窗、紗門



# 全民總動員 清除孳生源

＝ 清除孳生源口訣記起來！ ＝

## 巡



積水容器、水溝

## 倒



倒除容器積水



不要幫病媒蚊  
養寶寶喔！



## 清



澈底清潔  
使用中容器

## 刷



刷除蟲卵，  
容器要收好



衛生福利部疾病管制署 啟  
TAIWAN CDC 啟