



新冠疫苗接種注意事項

讓軍醫成為您保家衛國的後盾

接種疫苗	AstraZeneca (AZ)	莫德納 (Moderna)
30分鐘內	<ul style="list-style-type: none"> 留意是否出現立即型嚴重過敏反應或休克 適度加壓注射部位，不可搓揉 	
48小時左右	<ul style="list-style-type: none"> 適度補充水分，充分休息，避免酒類等刺激性食物或飲料 除非醫師另有指示，原長期使用藥物宜持續服用 經醫師、藥師指示可服用退燒藥，不宜服用超過兩天，且不建議在接種前預防性服用，可能影響免疫反應 若出現意識改變、單側肢體乏力、呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速或心律不整、全身紅疹、持續發燒超過48小時等現象，應儘速就醫 	
緩解方式	<ul style="list-style-type: none"> 接種部位冰敷(15分鐘)，活動手臂並做簡易伸展 適量喝水，促進代謝 	
28天內	出現以下 任一症狀 請 立即就醫 並說明疫苗接種史	
	嚴重持續 頭痛 、 視力改變 或 癩癩 持續 腹痛 超過 24小時 以上、 嚴重 胸痛 或 呼吸困難 、 下肢腫脹 或 疼痛 、皮膚出現 自發性出血點 瘀青 、 紫斑 等	mRNA疫苗 ，年輕族群應特別注意 ✓ 胸痛 (悶)、 ✓ 喘 (呼吸急促)或 ✓ 心悸 (心跳加快、劇烈跳動)等 症狀
綜合評估	第一劑副作用較為明顯且強烈	第二劑副作用較強烈，手臂可能會有延遲性過敏及紅腫

**最好的疫苗：
就是您現可接種到的疫苗！**



資料來源：衛生福利部疾病管制署
COVID-19疫苗專區



國軍防疫。你我一齊。國軍疫情指揮中心 關心您

